

مطالعات تشریحی دمبرگ در جنس زبان در قفا در ایران

منیژه پاکروان^{۱*}، رقیه زارعی^۲، زهرا خلچ^۳

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۲/۸

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱/۳۱

چکیده

جنس زبان در قفا (*Consolida*) از تیره آلاله در طایفه *Delphinieae* قرار دارد. این جنس شامل ۵۲ گونه بوده و اعضای جنس *Aconitella* را نیز در بر می‌گیرد. زبان در قفا با ۲۴ گونه در ایران یکی از پرگونه ترین کشورها در جنوب غرب آسیا محسوب می‌شود. در این تحقیق ویژگی‌های تشریحی دمبرگ ۱۶ گونه از جنس زبان در قفا مورد بررسی قرار گرفتند. از هر گونه سه جمعیت بررسی شد. بعد از پیش تیمار نمونه‌ها، برش‌های دستی از دمبرگ گرفته شد و برش‌ها توسط رنگ‌های کارمن و سبز متیل رنگ آمیزی شدند. از نمونه‌ها توسط میکروسکوپ نوری اولیمپوس عکس برداری شد. نتایج ما نشان داد که وجود گوشه، حضور یک لایه کلانشیم در زیر اپیدرم، نوع و تعداد دستجات آوندی وجود بافت مکانیکی بین دستجات آوندی وجود کرک صفات کلیدی در تشخیص گونه‌ها هستند. بر اساس مطالعات تشریحی دمبرگ گونه‌های دو زیرجنس *Consolida*، از یکدیگر جدا شده و در دو گروه قرار گرفتند که تایید کننده نتایج مطالعات سیستماتیک مولکولی در جنس *Aconitella* است.

واژه‌های کلیدی: ایران، تشریح، علف هرز، میکروسکوپ نوری.

مقدمه

گونه‌های مختلف زبان در قفا علف‌های هرز مزارع گندم و حبوبات و سایر مزارع می‌باشند. جنس زبان در قفا (DC.) توسط Gray (1821) بر اساس یک گونه به عنوان جنسی مستقل معرفی شد. برخی محققان زبان در قفا را به عنوان بخشی از *Delphinium L.* مورد ملاحظه قرار دادند (De Candole 1824; Boissier 1867; Nevskii 1937). برخلاف سایر اعضای *Delphinium* این جنس با فرم رویشی یکسانه، گلبرگ تکی مهمیز مانند و برگ‌های تکی شناخته شدند. برخی گونه‌های *Aconitella* بر اساس شکل متفاوت گلبرگ و کاسبرگ مهمیز مانند تحت عنوان جنس *Consolida* Soo 1922; Munz 1967 a.b.; Davis 1965 قبول کردند؛ اما از محققان برخی از *Aconitella* را زیرجنسی از *Consolida* گرفتند. برخی از محققان

۱-دانشیار، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

*(نویسنده مسئول : mpf176@yahoo.com)

۲-استادیار، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

۳-دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

(Iranshahr et al. 1992; Constantinidis et al. 2001). مطالعات بیوسیستماتیک متعددی در زمینه های مختلف بر روی این تاکسون ها انجام شده است (Tavassoli et al. 2016; Pakravan et al. 2018)، تا رابطه صحیح گونه ها را مشخص کنند. در مطالعات اخیر بر اساس توالی DNA محققان مانند Jabbour & Renner 2011 نشان دادند که *Aconitella* و *Consolidsa* صورت کلادی در بین گونه های *Delphinium* قرار می گیرند و پیشنهاد کردند که *Consolidsa* به عنوان بخشی از گونه های *Delphinium* مورد مطالعه قرار گیرند.

مطالعه تشریحی در تیره آلاله توسط برخی محققان مورد بررسی قرار گرفته است (Kokdil et al. 2006; Tobe 1980; Kavathekar & Pillai 1976; Tumanian 1965; Smith 1928; Novikoff & Mitka 2011; Gostin 2011; Novikoff ;2009b; 2010; 2011a,b; 2015; Sheidae et al. 2011) مطالعه تشریحی دمیرگ نیز در این تیره صورت گرفته که از جمله می توانیم به مطالعات Trifonova (1977) بر روی برخی گونه های جنس های *Delphinium* و *Consolida*، *Aconitella* و *Aconitum* توسط Novikoff (2009) اشاره کنیم.

هدف از این تحقیق استفاده از صفات تشریحی دمیرگ در گونه های *Consolida* و *Aconitella* بود تا مشخص شود آیا ویژگی های دمیرگ میتواند شباهت ها و تفاوت های *Consolida* و *Aconitella* را آشکار سازد و آیا این ویژگی ها می توانند نتایج مطالعات فیلوجنی را تایید کند.

مواد و روش ها

مطالعات صحراوی در کنار بررسی نمونه های هرباریومی در ۱۶ گونه از جنس زبان در قفا صورت گرفته است. این گونه ها به شرح زیرند :

C. tehranica (Boiss.) Rech.f. . (Boiss.) Schrödinger *C. anthoroidea*. (Boiss.) Grossh. *C. hohenackeri* .*C. persica* (Boiss.) Grossh.. (L.) Ball & Heywood *C. ambigua* . (Gray) Schrödinger *C. orientalis*f. *paradoxa* (Bunge) Iranshahr, *C. stocksiana* Nevski , *C. rugulosa* Schrödinger f. *rugulosa*. Gray *C. regalis*, *C. oliveriana* (DC.) Schrödinger .*C. camptocarpa* (Fisch.& C.A. Mey.) Nevski , Nevski *C. leptocarpa*. (Boiss.) Iranshahr *C. aucheri*. , (DC.) Schrödinger ex Hand.-Mazz *C. flava*. *C. oligantha* Schrödinger

به منظور انجام مطالعات تشریحی، برش های عرضی توسط دست از نواحی میانی دمیرگ تهیه شد. نمونه ها به مدت ۱۵ دقیقه در محلول آب ژاول قرار داده شدند. بعد از شستشو با آب به مدت ۵ دقیقه در کارمن زاجی قرار داده شد. پس از شستشو به مدت ۲ دقیقه در سبز متیل قرار داده و مجدداً شستشو داده شد. بهترین اسلایدها انتخاب شده و توسط میکروسکوپ نوری Olympus model Bx51 عکس برداری شدند. نمونه های مورد بررسی در هرباریوم های دانشگاه الزهرا (ALUH) و موسسه

تحقیقات جنگل ها و مرتع (TARI) نگه داری می شوند. محل های جمع آوری نمونه ها و شماره هرباریومی و جمع آوری کننده ها در جدول ۱ امده است.

جدول ۱: فهرست نمونه های مطالعه شده و محل نگهداری آنها

Species	Province	Voucher herbarium	No.	Collectors
<i>C. camtocarpa</i> (Fisch. & C.A. Mey.) Neveski	Khorassan: Jajarm road	ALUH	1599	Poorhabibian
<i>C. camtocarpa</i> (Fisch. & C.A. Mey.) Neveski	Semnan: 58 km of Shahrud to Sabzevar	ALUH	35379	Poorhabibian
<i>C. leptocarpa</i> Nevski	Golestan: Golestan natural park, Mirzabailoo	ALUH	1590	Poorhabibian
<i>C. leptocarpa</i> Nevski	Khorassan: Sarakhs road	ALUH	1605	Poorhabibian
<i>C. leptocarpa</i> Nevski	Khorassan: Sarakhs , 14 km to Mozduran	ALUH	1600	Poorhabibian
<i>C. leptocarpa</i> Nevski	Semnan: Shahrood	ALUH	34369	Poorhabibian
<i>C. persica</i> (Boiss.) Schrod.	Hamedan: Khan abad	ALUH	1555	Poorhabibian
<i>C. persica</i> (Boiss.) Schrod	Tehran: Firuzkuh	ALUH	1556	Pakravan
<i>C. persica</i> (Boiss.) Schrod	Azharbaijan: Tabgriz, Ahar road	ALUH	1606	Pakravan
<i>C. rugulosa</i> Schrodgr	Golestan: Golestan Natural park, Mirzabailoo	ALUH	1597	Poorhabibian
<i>C. rugulosa</i> Schrodgr	Khorassan: Mashhad,	ALUH	1557	Poorhabibian
<i>C. rugulosa</i> Schrodgr	Hamedan: Khan abad	ALUH	1558	Poorhabibian
<i>C. rugulosa</i> Schrodgr <i>paradoxa</i> (Bunge) Iranshahr	Khorassan: Neyshabur, Sharif abad village	ALUH	1598	Poorhabibian
<i>C. antheroidea</i> (Boiss.) Schrod.	Hamedan: almaghlagh village	ALUH	1586	Pakravan
<i>tehranica</i> (Boiss.) Rech.f. <i>C.</i> Hamedan: Nahavand road, Garo Mt.		ALUH	1595	Pakravan
<i>tehranica</i> (Boiss.) Rech.f. <i>C.</i>	Mazandaran	TARI	۵۱۴۹۹	Assadi & Maasoumi
<i>tehranica</i> (Boiss.) Rech.f. <i>C.</i>	Mazandaran:, Polsefid, Do-ab	ALUH	5077	Zare & Amini
<i>anthoroidea</i> (Boiss.) Schrod. <i>C.</i>	Tehran: between Eshtehard and Karaj	ALUH	۱۷۰۱	Pakravan
<i>anthoroidea</i> (Boiss.) Schrod. <i>C.</i>	Tehran: 8 Km from Tafresh to Saveh	TARI	۱۳۱۶۴	Assadi & Shirdelpoor
<i>anthoroidea</i> (Boiss.) Schrod. <i>C.</i>	Azharbaijan: Targovar reg. 3 Km from Monava to sero	TARI	368263	Izadpanah & Taheri
<i>.anthoroidea</i> (Boiss.) Schrod. <i>C</i>	Hamedan: Garow montain	ALUH	1595	Poorhabibian
<i>.hohenackeri</i> (Boiss.) Grossh <i>C</i>	Markazi: Arak, Chepoghi	ALUH	2783	Mahdavi

<i>.hohenackeri</i> (Boiss.) Grossh C	Bakhtiari: Shahrekord	TARI	57623	Mozaffarian
<i>rugulosa f. paradoxa</i> C.	Kharassan: Mashhad, 30 Km to Sarakhs road	TARI	5526	Frughi
<i>rugulosa f. paradoxa</i> C.	Khorassan: Mashhad	ALUH	28520	Poorhabibian
<i>ambigua</i> (L.) Ball. & Heywood C.	Kermanshah: road toward Ghasre-shirin	ALUH	۲۴۶۶۳	Seraj
<i>ambigua</i> (L.) Ball. & Heywood C.	Kermanshah: Mahi-dasht,	TARI	1548	Hamzeei
<i>orientalis</i> Schrödinger C.	Mazandaran: Sari, Gonbad		5076	Zare & Amini
<i>orientalis</i> Schrödinger. C.	Khorassan: Kalat to Archangan	ALUH	28943	Poorhabibian
<i>orientalis</i> Schrödinger. C.	Mazandaran: Sari, Do-gonbadan	ALUH	۵۰۸۴	Zare & Amini
<i>orientalis</i> Schrödinger. C.	Mazandaran: Babol	ALUH	۲۷۵۴۳	Poorhabibian
<i>orientalis</i> Schrödinger. C.	Mazandaran: Nowshahr	ALUH	۵۰۷۵	Zare & Amini
<i>regalis</i> . Gray C.	Mazandaran: Pol-sefid	ALUH	۵۰۸۶	Zare & Amini
<i>regalis</i> Gray C.	Mazandaran: NW of Challus, between Pol-zoghal and Veysar	TARI	۲۵۸۹۲	Mozaffarian
<i>regalis</i> Gray C.	Azarbayan: 20 km from Jolfa to Marand	TARI	۲۰۰۳۶	Assadi & Wendelbo
<i>regalis</i> Gray C.	Azarbayan: Arasbaran prot. reg.	TARI	۲۰۵۳۱	Mozaffarian
<i>oliveriana</i> (DC.) Schrödinger C.	Azarbayan: Tabriz	ALUH	۱۶۰۶	Zare
<i>flava</i> (DC.) Schrödinger ex Hand.- C. Mazz	Lorestan: 110 Km from Khorram abad to Andimeshk	TARI	۱۶۶۱۶	Mozaffarian
<i>flava</i> (DC.) Schrödinger ex Hand.- C. Mazz	Kermanshah: 31 Km from Kermanshah to Ghasre-shirin	TARI	۲۴۹۰۰	Mozaffarian
<i>oligantha</i> Schrödinger C.	Khuzestan: Do-gonbadan, 12 Km to Behbahan	TARI	9422	Hatami

Abbreviations: No.= herbarium number, ALUH= Alzahra University Herbarium; TARI: herbarium of Research institute of Forests and rangelands

نتایج و بحث

دمیرگ در *C. regalis* (شکل ۴) و *C. stocksiana* (شکل ۳) (G,H-۴)

C. oliveriana (شکل ۵) (A,B-۵) با مقطع نعل اسپی تا V شکل بوده و شیار عمیق تا نسبتاً عمیق دارد و لی

C. flava (E,F-۳) (شکل ۳) (C,D-۵) *C. aucheri* (A,B-۳) (C. leptocarpa) (G,H-۲) (شکل ۲) *camptocarpa*

oligantha (شکل ۵) (E,F-۵) دارای دمیرگی هستند که در برش عرضی متله شکل و سطح شکمی تقریباً مسطح می باشند.

دمیرگ در *C. regalis* (شکل ۲) و *C. hohenackeri* .*C. anthoroidea* .*C. tehranica* در دو انتهای کاملاً گوشه

دارد و لی *C. orientalis* (شکل ۳) *C. aucheri* .*C. leptocarpa* (G,H-۲) (شکل ۲) *C. camptocarpa*


، (۳) *C. stocksiana* .*C. aucheri* .*C. persica* (شکل ۵) و *C. oligantha* و *C. flava* .*C. oliveriana*

C. oligantha (A,B-۴) و *C. rugulosa f.rugulosa* (شکل ۵-E,F-۵) کمی گوشه دار می باشد. تنها گونه های *C. flava* (شکل ۴-G,H-۴) و *C. regalis* (شکل ۲-C,D-۵) دارای یک لایه کلانتیم (شکل ۲-C,D-۵) دارای یک لایه کلانتیم (شکل ۴-G,H-۴) و *C. oliveriana* (A,B-۴) (شکل ۳-C,D-۵) دارای سه نوع دستجات آوندی می باشند: دستجات آوندی پشتی - میانی (DMB)، دو دسته آوندی جانبی اصلی (MLB) و دستجات آوندی حاشیه ای (RB)(شکل ۱) ولی گونه های *C. ambigua*, *C. regalis* (شکل ۴)، دارای دو نوع دستجات آوندی می باشند: دستجات آوندی پشتی - میانی (DMB) و دو دسته آوندی جانبی اصلی (MLB) (شکل ۱). از میان گونه ای مورد بررسی تنها *C. rugulosa f.rugulosa* (شکل ۳-A,B-۴) *C. leptocarpa* (شکل ۲-G,H-۴) *C. camptocarpa* (شکل ۴-A,B-۴) *C. stocksiana* .*C. aucheri persica* (شکل ۳-E,F-۴) *C. orientalis* (A,B-۵) (شکل ۳-C,D-۴) *C. flava* (شکل ۵-G,H-۴) دارای دستجات آوندی LB هستند . گونه های *C. camptocarpa* (شکل ۲-C,D-۵) دارای غلاف اسکلرانشیمی هستند ولی گونه های *C. anthoroidea* .*C. tehranica* (شکل ۲-E,F-۴) فاقد غلاف اسکلرانشیمی هستند ولی گونه های *C. persica* (E,F-۲) *C. hohenackeri* (شکل ۲-C,D-۵) *C. regalis* (G,H-۴) و *C. flava* (شکل ۴-C,D-۴) دارای غلاف اسکلرانشیمی با تیپ R بوده و گونه های *C. stocksiana* .*C. aucheri* (شکل ۳-C,D-۴) *C. ambigua* (شکل ۳-C,D-۴) دارای غلاف اسکلرانشیمی با تیپ A می باشند. تنها گونه *C. tehranica* دارای بافت مکانیکی بین دستجات آوندی است (شکل ۲-A,B-۲). تمام گونه ها بجز *C. ambigua* در سطح دمبرگ دارای کرک می باشند (شکل ۴-C,D).


جدول ۲: صفات به کار رفته در مطالعات تشریحی دمبرگ گونه های زبان در قفا

Species	deep groove	angular petiole	Cue	Kind of vascular bundles	DVA (μm)	VD(μm)	DMB(μm)	MLB(μm)	RB	LB	SB	SB type	Cbv	Hair
<i>C. tehranica</i>	+	+	+	2.1	700-720	720-725	95-97	70-73	-	-	+	R	-	+
<i>C. anthoroidea</i>	+	+	-	2.1	907-1025	597-650	92-98	52-60	-	-	+	R	+	+
<i>C. hohenackeri</i>	+	+	+	2.1	1280-1451	880-1058	135-216	92-113	-	-	+	R	-	+
<i>C. campnocarpa</i>	-	-	-	2,1,3	1125-1354	730-916	138-116	96-98	23-50	+	-	-	-	+
<i>C. leptocarpa</i>	-	-	-	3,2,1	1255-656	760-393	187-100	50-88	27-82	+	-	-	-	+
<i>C. persica</i>	-	-	-	2,1	1200-950	732-621	123-119	66-52	-	+	+	R	-	+
<i>C. aucheri</i>	-	-	-	2,1	1005-990	870-847	145-132	84-91	-	+	+	A	-	+
<i>C. stocksiana</i>	-	-	-	2,1	1095-824	537-532	113-100	61-73	-	+	+	A	-	+
<i>C. rugulosa f.rugulosa</i>	+	-	-	3,2,1	1219-1949	931-677	135-124	977-931	72-80	+	-	-	-	+
<i>C. ambigua</i>	-	-	-	2,1	1005-990	870-847	902-851	345-355	-	-	+	A	-	-
<i>C. orientalis</i>	-	-	-	2,1	1670-2170	1460-678	358-314	-	-	+	-	-	-	+
<i>C. regalis</i>	+	+	+	2,1	1450-2002	1400-880	232-210	-	-	-	+	R	-	+
<i>C. oliveriana</i>	-	-	-	3,2,1	719-715	1010-1016	172-170	55-57	-	+	-	-	-	+
<i>C. flava</i>	-	-	+	2,1	1220-1566	944-584	156-110	-	-	+	+	R	-	+
<i>C. oligantha</i>	-	-	-	3,2,1	1041-1153	574-502	148-134	60-72	31-89	+	-	-	-	+


انواع دستجات آوندی=Kind of vascular bundles، وجود کلاژنیم زیر اپیدرم=cue، کاملاً گوشه دار بودن دمبرگ=deep groove، شیار کاملاً عمیق=angular petiole، دستجات آوندی حاشیه ای=RB، دستجات آوندی جانی اصلی=MLB، دستجات آوندی پشتی سینایی=DVA، طول محور شکمی=VD، بافت مکانیکی بین دستجات آوندی=Cbv، تپ غلاف اسکلرائشیمی=SB type، غلاف اسکلرائشیمی=SB، دستجات آوندی فرعی=LB، cue=collenchymas under epidermis، MLB=main lateral vascular bundle، DMB=middle vascular bundle، VD=length of ventral axis، DVA=length of dorsiventral axis، Cbv=Collenchymas between vascular bundle، SB type=Type of bundle sheath، SB=bundle sheath، LB=marginal vascular bundle.




شکل ۱: ویژگی های تشریحی دمبرگ زبان در قفا.




شکل ۲: برش عرضی دمیرگ .*C. anthoroidea* :C,D .*C. tehranica* :A,B .*C. capmtocarpa* :G,H .*C. hohenackeri* :E,F



شکل ۳: برش عرضی دمبرگ، *C.persica* :C,D *C. leptocarpa*:A,B،
C. stocksiana :G,H *C. aucheri* :E,F



شکل ۴: برش عرضی دمیرگ، *C. ambigua* :C,D ، *C. rugulosa* f.*rugulosa* :A,B ،
C. regalis :(G,H) .*C. orientalis* :E,F



شکل ۵: برش عرضی دمبرگ .C. olighantha: E,F .C. flava :C,D .C.oliveriana :A,B

نتیجه گیری کلی

گونه های زیر جنس *Aconitella* شامل *C. hohenackeri* و *C. anthoroidea* .*C. tehranica* همگی دارای دمبرگی کاملاً گوشه دار، شیار کاملاً عمیق، با دستجات آوندی R و DMB و فاقد دستجات LB و RB و نیپ غلاف آوندی R می باشند (شکل ۲).

در زیر جنس *Consolida* دمبرگ گونه های *C. leptocarpa* .*C. camptocarpa* و *C. oliveriana* .*C. olighantha* از لحاظ خصوصیات تشریحی بررسی شده قابل تفکیک از هم نیستند، از نظر ریخت شناسی دو گونه اول صفات مشابه زیادی دارند و اختلاف اندک ریختی جداسازی آنها را مشکل می سازد. تفاوت *C. orientalis* با چهار گونه ذکر شده در داشتن دو نوع دستجات آوندی R و DMB به جای سه نوع است (شکل ۴). از بین گونه های باقی مانده که شامل *C. aucheri* .*C. persica* .*C. rugulosa f.rugulosa* و *C. rugulosa f.rugulosa stocksiana* است، تنها *C. flava* و *C. regalis* .*C. rugulosa f.rugulosa stocksiana* فاقد غلاف اسکلرانشیمی

هستند (شکل-A,B)، تنها *C. regalis* فاقد دستجات آوندی LB است (شکل-G,H-۴)، تفاوت *C. persica* و *C. flava* در داشتن یک لایه کلانشیم در زیر اپیدرم در *C. flava* است (شکل-C,D). دارای دمبرگ نعلی شکل با کمی گوشه در دو انتهای (شکل-E,F-۳) و شیار نسبتاً عمیقی دارد ولی در *C. aucheri* دمبرگ مثلثی، فاقد گوشه و در سطح شکمی مسطح و دارای کرک های بسیار متراکم می باشد که می توان بر این اساس این دو گونه را از هم جدا کرد (شکل-G,H-۴).

نتایج بررسی های تشریحی دمبرگ، اعضای دو زیر جنس *Consolida* و *Aconitella* را کاملا از هم مجزا کرد. نتایج مشابه در بررسی های سیستماتیک مولکولی انجام شده توسط Jabbour و Renner و Pakravan و همکاران (2018) حاصل شده بود به طوریکه گونه های این دو زیر جنس در دو کلاد مجزا در داخل جنس *Delphinium* واقع شدند (Renner & Jabbour 2011). این مطالعه نشان می دهد که ویژگی های دمبرگ صفات مفیدی در تفکیک گونه ها می باشد. همانطور که (Trifonova 1990) در بررسی تشریحی دمبرگ در نمایندگان جنس های *Consolida*، *Aconitella* و *Delphinium* ذکر کرده بود.

سپاسگزاری

بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا جهت تامین منابع مالی طرح پژوهشی قدردانی میگردد.

منابع

- Boissier, E. (1867) Flora Orientalis voli primum, Thalamiflorae. Basilieae.
- Constantinidis, T., Paras, G. K. & Kamari, G. (2001) Seed morphology in relation to infrageneric classification of *Consolida* (Dc.) S. F. GRAY (Ranunculaceae). Flora, 196: 81–100.
- Davis, P. H., Mill, R.R. & Tan Kit (eds.) (1988) Flora of Turkey and the East Agent Islands vol. 10 (supplementum). Edinburgh University Press. Edingburgh.
- De Candolle, A. P. (1824) Prodromus systematics naturalis regni vegetabilis, pars prima, Parisiis.
- Gostin, I. N. (2011) Anatomical and micromorphological peculiarities of *Adonis vernalis* L. (Ranunculaceae). Pakistan Journal of Botany, 43:811 – 820.
- Iranshahr, M., Rechinger, f., K.H., Riedl, H. (1992) *Consolida*. In: Rechinger, K. H. (ed.). Ranunculaceae, Flora Iranica, No. 171: 44-114. Akademische Druck. U. Verlagsanstalt. Graz, 89-114.
- Jabbour, F., Renner, S.S. (2012) A phylogeny of *Delphinieae* (Ranunculaceae) shows that *Aconitum* is nested within *Delphinium* and that Late Miocene transitions to long life cycles in the Himalayas and Southwest China coincide with bursts in diversification. Molecular Phylogeny and Evolution, 62: 928–942.
- Jabbour, F., Renner, S.S. (2011a) *Consolida* and *Aconitella* are an annual clade of *Delphinium* (Ranunculaceae) that diversified in the Mediterranean basin and the Irano-Turanian region. Taxon, 60, 1029–1040.
- Kavathekar, K.Y. and Pillai, A. (1976) Studies on the developmental anatomy of Ranales. II – Nodal anatomy of certain members of Annonaceae, Magnoliaceae, Menispermaceae and Ranunculaceae. Flora. 165: 481 – 488.

- Kokdil, G. Ilcim, A., Ozbilgin, B., Uygun, C.(2006) Morphology and stem anatomy of some species of genus *Nigella* L. in Turkey. Ankara Ecz Üniverstesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 35: 19 – 41.
- Munz, P.A.(1967a). A synopsis of African species of *Delphinium* and *Consolida*. Journal of Arnold Arbratum, 48:30–55.
- Munz, P.A. (1967b) A synopsis of Asian species of *Consolida* (Ranunculaceae). Journal of Arnold Arbratum , 48: 159–202.
- Nevskii, S. A. (1937) *Delphinium* L. In: Shishkin, B.K. (ed.), Flora of the Ussr, 7: 79–143. – Moskva,Leningrad.
- Novikoff , A.V. (2009b) Anatomical organization of petioles of some species from the genus *Aconitum* L. Plant introduction,selection and protection (Proc. II Int. Sci. Conf., Ukraine, Donetsk, 6 – 8 Oct 2009): 197 – 198.
- Novikoff , A.V. (2010) Some features of anatomical structure of the stem of *Aconitum moldavicum* Hacq. and *Aconitum lycocotonum*L. em. Koelle (Ranunculaceae). Studia Biologica, 4: 109 – 114.
- Novikoff , A.V. and Mitka, J. (2011) Taxonomy and ecology of the genus *Aconitum* L. in the Ukrainian Carpathians. Wulfenia, 18: 37 – 61.
- Novikoff , A.V. (2011a) Nodal anatomy of the genus *Aconitum* L.(Ranunculaceae). Proc. V Int. Conf. Young Sci., (Ukraine, Odessa, 13 – 17Jun 2011: 47 – 48).
- Novikoff , A.V. (2011b) Nodal anatomy of the representatives from the section *Aconitum* subgenus *Aconitum* (*Aconitum* L., Ranunculaceae). Proceedings of the United States National Museum, 27: 111 – 125.
- Novikoff , A.V. (2015) Th e leaf blade anatomy of some *Aconitum* (Ranunculaceae) in Eastern Carpathians. Nordic Journal of Botany, 33: 633–640.
- Pakravan, M., Dastpak, A., Sonboli, A., & Khalaj, Z. (2018) A taxonomic reassessment of *Consolida* (Ranunculaceae) species: insight from morphological and molecular data. Journal of Genetic Resources, 4(1): 14-25.
- Sheidai, M., Azizian, D., Ghorbani Nohooji, Mahboobeh K. (2011) Taxonomic value of stem anatomical characters in classification of some *Adonis* (Ranunculaceae) species in Iran. Taxonomy and Biosystematics, 3(6): 69-78.
- Soo, R. Von (1922) Über die mitteleuropäischen Arten und Formen der Gattung *Consolida* (DC.)S. F. Gray. Oesterreichische botanische Zeitschrift, 71: 233–246.
- Smith, E. P. (1928) A comparative study of the stem structure of the genus *Clematis* , with special reference to anatomical changes induced by vegetative propagation. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 55: 643 – 664.
- Tavassoli, A., Pakravan, M., Kiarostami, K . and Poorhabibian, R. (2012) Karyotype analysis in some species of *Consolida* (Ranunculaceae) from Iran. Feddes Repertorium, 123 (4), 257-263
- Tobe, H. (1980) Morphological studies on the genus *Clematis* Linn. VIII. Floral and inflorescence anatomy in *Clematis patens* with eight-sepaled flowers. The Botanical magazine, Tokyo
- Trifonova, V.I. (1990) Comparative biomorphological study of the taxonomy and phylogeny of the genera *Consolida* (DC.) S.F.Gray and *Aconitella* Spach. Collectanea Botanica (Barcelona), 19: 97-110.
- Tumanian, S. A. (1965) The peculiarities of anatomical structure of the stem and leaf in species of *Aconitum* L. Trudy Glavnago Botanicheskago Sada. (Bull. Main Bot. Gard.) 59: 59 – 66.

Anatomical study on the petiole of *Consolida* species in Iran

M. Pakravan^{1 *}, R. Zarei², Z. Khalaj³

Received: 2018.4.28

Accepted: 2019.4.20

Abstract

The genus *Consolida* (DC.) S. F. GRAY of Gray is a member of Ranuculaceae family, Delphinieae tribe.. It comprises approximately 52 species which almost all of them are weed and includes the members of the genus *Aconitella* Spach. The genus distributed in Iran with 24 species, Iran is thus one of the richest countries for the genus in South-West Asia. *Consolida* has separated from *Delphinium* by De Candolle based on single-spurred petals , one follicle and annual life cycle and has occurred in separate section. Finally it introduced as a separate genus by Gray in 1821. In this study the petiole anatomy of 16 species of the genus *Consolida* have investigated. Three population from each species have examined. After pre-treatment of the material , hand sections prepared and Carmen and methyl green solution used for staining the materials. Olympus light microscope used for study and photography. Our results showed that the presence of : angle, collenchymas layer below the epidermis, the number of vascular bundles LB, vascular sheath type, mechanical tissue between the vascular bundles and type of vascular bundles and indumentums of petiole are diagnostic characters for distinguishing the species. Based on anatomical results the species of two subgenera (*Consolida* and *Aconitella*) have separated and this confirmed the results of molecular systematic study of the genus.

Key words: anatomy, Iran, light microscope, weed

1- Associate Professor, Department of Biological science, Alzahra University, Tehran, Iran
(corresponce for Author: mpf176@yahoo.com)

2- Assistant Professor, Department of Biological science, Alzahra University , Tehran, Iran
3- Graduated student, Department of Biological science, Alzahra University, Tehran, Iran